

云南鸟类评论

Reivew of Yunnan Birds

2021-6月

本期特稿：褐头雀鹛和灰头雀鹛



封面摄影：高僖

云南鸟类评论

出版说明

云南鸟类评论是非商业的电子月刊，由云南鸟类学习群出版，专门为鸟友学习云南鸟类而设，内容主要围绕云南鸟类，包括云南鸟类分类、分布等，免费提供给公众阅读。

编辑：张浩辉

本期目录（2021 年 6 月）

1. 褐头雀鹛和灰头雀鹛	张浩辉	2
2. 普通夜鹰和林夜鹰	张浩辉	7
3. 棕眉柳莺和巨嘴柳莺	张浩辉	14
4. 长尾鹡鸰和淡喉鹡鸰	张浩辉	17
5. 布氏鸚与理氏鸚比较	张浩辉	21

感谢以下鸟友为本期文章提供照片：

klwei、Koel Ko、Martin Hale、Yau、艾怀森、董江天、钢铁侠、高僊、江敏儿、黄理沛、老爷子、李锦昌、林子大了、麦荏、鸟林细语、秋之叶、沙波、时间、天涯游侠、庭草、望月、遥远、云雀、张果老、张浩辉、赵泽恒、周彬康、周哲

封面摄影：灰头雀鹛，四川雅安 2010-7-27，高僊拍摄

之前发布的云南鸟类评论期刊可在这个网页下载：<https://birdreview.gitee.io>

云南鸟类学习群

云南鸟类学习群成立于 2019 年初。旨在推广云南鸟类学习，主要活动有微信群讨论、云南观鸟活动、云南鸟类数量调查、云南每月鸟讯、云南鸟类评论、云南州市鸟类名录更新等，目标是推动野鸟保护。

我们是非盈利的公益微信群，活动不收费，不接受项目经费收入，不接受捐款，群内全部运作经费由群负责人承担。

云南鸟类学习群的结构及负责人如下：

群主：张浩辉先生

义务秘书：晓芳女士

联络电话：张浩辉 18123828849

微信二维码：看右方



褐头雀鹛和灰头雀鹛

张浩辉，云南鸟类学习群

灰头雀鹛是大约 20 年前褐头雀鹛的分种，云南两种都有，本文讲一下这两种雀鹛及其亚种；

1. 褐头雀鹛 *Fulvetta manipurensis*
2. 灰头雀鹛 *Fulvetta cinereiceps*

1. 褐头雀鹛*manipurensis*亚种

分布： 云南西部至中部；

特征： 头部灰色沾褐色，有浅色眉纹及褐色侧冠纹，喉部有白色细纹，看图 1，图 1 右这只褐色很浓，比较少见，大概是未成年鸟；



图 1. 褐头雀鹛 *manipurensis* 亚种，左：云南 2012-4-29，klwei 拍摄；右：保山市 2013-6-10，麦荏拍摄

2. 褐头雀鹛*tonkinensis*亚种

分布： 云南中部至南部；

特征： 跟 *manipurensis* 亚种相似，主要分别是侧冠纹黑色，喉部白色细纹更加明显，看图 2。



图 2. 褐头雀鹛 *tonkinensis* 亚种，红河州 2015-5-2，望月拍摄

3. 灰头雀鹛 *cinereiceps* 亚种

分布： 四川中部和南部至贵州西部，也有在云南昭通市；
特征： 跟褐头雀鹛的主要分别是头部比较纯灰色，没有贯眼纹和眉纹，只隐约侧冠纹、主要在前半段，喉部白色细纹不明显，虹膜比较亮白色，看图 3。



图 3. 灰头雀鹛 *cinereiceps* 亚种，左：四川眉山 2009-4-26，老爷子拍摄；右：四川雅安 2006-8-20，庭草拍摄

4. 灰头雀鹛 *fessa* 亚种

分布： 四川北部至甘肃南部、宁夏南部和陕西南部；

特征： 跟灰头雀鹛 *cinereiceps* 亚种十分相似，主要分别是背部棕色比较淡、沾橄榄绿色，腹部也比较浅色，看图 4。



图 4. 灰头雀鹛 *fessa* 亚种，甘肃 2017-7-11，遥远拍摄

5. 灰头雀鹛 *fucata* 亚种

分布： 广西东北部、贵州北部、湖南东南部至湖北西部；

特征： 跟灰头雀鹛 *cinereiceps* 亚种相似，主要分别是头冠浅棕色，看图 5。



图 5. 灰头雀鹛 *fucata* 亚种，左：重庆 2019-7-15，周哲拍摄；右：重庆 2011-8-2，秋之叶拍摄

5. 灰头雀鹛 *guttaticollis* 亚种

分布：广东北部至福建西北部，广西东部也有，看图 6；

特征：跟灰头雀鹛 *fucata* 亚种相似，也是头部浅棕褐色，主要分别是头冠棕色比较浅、比较偏灰褐色，隐约有侧冠纹，胸部有比较明显的细纹，看图 6。



图 6. 灰头雀鹛 *guttaticollis* 亚种，广西 2009-冬季，张果老拍摄

以上亚种分布主要是根据 Birds of the World 网页，这网页还提到灰头雀鹛 *fucata* 和 *guttaticollis* 亚种有需要进一步研究，大概有分种可能。

参考文献

1. Craig Robson (2015), *Birds of South-East Asia*, 2nd Edition, Christopher Helm
2. Collar, N. and C. Robson (2020). Streak-throated Fulvetta (*Fulvetta manipurensis*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.sttful2.01>
3. Collar, N. and C. Robson (2020). Gray-hooded Fulvetta (*Fulvetta cinereiceps*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.sttful1.01>

普通夜鹰和林夜鹰

张浩辉，云南鸟类学习群

普通夜鹰在云南广泛分布，林夜鹰分布在云南中低海拔，因为在夜间活跃，所以记录偏少，好的照片不多，本文讲一下这两种夜鹰的区分方法；

1. 普通夜鹰 *Caprimulgus jotaka jotaka/hazarae*
2. 林夜鹰 *Caprimulgus affinis amoyensis*



图 1. 上：普通夜鹰 雄鸟，香港 2011-11-17，Koel Ko 拍摄；下：林夜鹰 雄鸟，香港 2009-5-26，Martin Hale 拍摄

1. 体型

东南亚鸟类手册 Craig Robson (2015) 记载普通夜鹰体长 28-32 厘米，林夜鹰 25-25.5 厘米，普通夜

鹰体型比较大。

2. 身体比例

普通夜鹰翼比较长，站立时翼尖很接近尾端，林夜鹰翼尖明显不到尾端，看图 1，很多照片上林夜鹰把翼尖收藏在尾巴底下，这样翼尖的位置就看不到；

3. 身体颜色

普通夜鹰英文为“灰夜鹰”，身体比较深色、颜色偏灰，林夜鹰身体比较浅色、颜色变化很大，一般为沙灰色，但也有橙灰色。身体颜色大概跟这两种夜鹰的习惯有关，普通夜鹰在白天多站在林中树干上休息，这样，深灰色是很好的保护色，林夜鹰白天喜欢在地上休息，因应不同泥土的颜色，林夜鹰身体颜色变化比较大。

4. 头部

- 头冠：普通夜鹰头冠有明显黑色纵纹，林夜鹰没有，看图 2；
- 下颊纹：普通夜鹰有明显的白色下颊纹，林夜鹰一般看不到下颊纹，如果有也是很微弱的，看图 1-2。

5. 身体

- 翼上小覆羽：普通夜鹰翼上小覆羽前段（手腕位置）近黑色，明显深色，林夜鹰翼上小覆羽颜色没变化、没有明显深色，看图 2；
- 身体纵纹：普通夜鹰身体有不少黑色纵纹，林夜鹰没有，看图 2；
- 肩膊：林夜鹰一般肩膊上有一条金黄色斑，普通夜鹰这条斑一般为灰色，也有由几个金黄色斑点组成，但不会是很连贯的金黄色，看图 2；
- 中覆羽斑点：普通夜鹰翼上中覆羽一般有圆形的金黄色斑点，斑点末端近有黑色鳞状纹，林夜鹰翼上中覆羽的金黄色斑点一般为三角形或多边形，斑点比较简单，末端少黑色，看图 2；



图 2. 上：普通夜鹰 雌鸟，上海 2017-10-19，时间拍摄；下：林夜鹰，香港 2004-10-17，江敏儿、黄理沛拍摄

6. 飞行

- 翼形状：普通夜鹰翼比较尖，翼尖由三根差不多长的“手指”组成，林夜鹰翼呈方形，翼尖由四根差不多长的“手指”组成，看图 3；
- 手掌斑点：普通夜鹰手掌的斑点比较小，看图 3；




图 3. 上：普通夜鹰 雄鸟，香港 2007-5-5，江敏儿、黄理沛拍摄；下：林夜鹰 雄鸟，香港 2009-4-9，Martin Hale 拍摄

7. 雌雄

普通夜鹰雄鸟手掌斑点为白色，近尾端两旁有大白点，雌鸟手掌斑点细小，为泥黄色，下颊纹也是泥黄色，尾部无白点，看图 4；

林夜鹰雄鸟手掌斑点为白色，最外侧尾羽几乎全白，看图 3，雌鸟手掌斑点泥黄色，尾部无白色；



图 4. 上：普通夜鹰 雄鸟，上海 2019-9-17，时间拍摄；下：普通夜鹰 雌鸟，香港 2007-5-5，江敏儿、黄理沛拍摄

8. 幼鸟

幼鸟全身斑纹比较暗淡，看图 5，图 5 这只幼鸟身体偏棕色，很少见，这颜色大概只某些幼鸟才有。



图 5. 林夜鹰 幼鸟，香港 2008-8-14，Yau 拍摄

9. 亚种

云南的林夜鹰是 *amoyensis* 亚种，普通夜鹰则有 *jotaka* 和 *hazarae* 亚种，以留鸟 *hazarae* 亚种为主，大概也有冬候鸟 *jotaka* 亚种，Birds of the World 网页记载 *hazarae* 亚种体型比较小，颜色比较深，色调比较暖、更偏褐色，看图 6。

10. 叫声

这两种夜鹰的叫声很好分，普通夜鹰是连续急速的“咄咄咄……”，林夜鹰是单声的“greet”，都很响亮。



图 6. 普通夜鹰 *hazarae* 亚种 未成年鸟，保山城区 2021-5-20，艾怀森拍摄

参考文献

1. Craig Robson (2015), *Birds of South-East Asia*, 2nd Edition, Christopher Helm
2. del Hoyo, J., N. Collar, and G. M. Kirwan (2020). Gray Nightjar (*Caprimulgus jotaka*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.grynig1.01>
3. Cleere, N. (2020). Savanna Nightjar (*Caprimulgus affinis*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.savnig1.01>

棕眉柳莺和巨嘴柳莺

张浩辉，云南鸟类学习群

棕眉柳莺和巨嘴柳莺十分相似，身体都是褐色为主，没有翼斑和冠纹，眉纹的前段比后段偏泥黄色，这两种柳莺在云南都有记录，数量也不是特别稀有，本文讲一下这两种的区分方法；

1. 棕眉柳莺 *Phylloscopus armandii*
2. 巨嘴柳莺 *Phylloscopus schwarzi*

棕眉柳莺有两个亚种，*perplexus* 亚种是短距离迁徙鸟，有少量在云南繁殖，*armandii* 亚种比较沾灰色，是长距离迁徙鸟，这两个亚种在云南都是迁徙鸟为主，夏天和冬天记录不多。巨嘴柳莺无亚种分化，在云南是冬候鸟。

1. 体型

棕眉柳莺体长 13-14 厘米，体重 8-10.5 克，巨嘴柳莺 13.5-14 厘米，体重 8-15 克，这两种柳莺大小差不多，但巨嘴柳莺平均体型比较壮，很多照片能看到这特征，看图 1；



图 1. 左：棕眉柳莺，北京 2013-5 月，董江天拍摄；右：巨嘴柳莺，北京 2009-9-20，张果老拍摄

2. 嘴形

不知道巨嘴柳莺中文是怎么命名的，巨嘴柳莺的嘴在柳莺属中并不巨大，似乎还在平均以下，跟棕眉柳莺比较，巨嘴柳莺的嘴比较厚，看来比较短，很多照片能看到这特征，看图 1，但嘴形容易受拍照角度影响，要小心多看不同角度。

3. 脚形

巨嘴柳莺的脚平均比较粗，很多照片能看到这特征，看图 2，虽然也有脚不明显粗的巨嘴柳莺，脚形也容易受拍照角度影响，要小心多看不同角度。



图 2. 左：棕眉柳莺，香港 2019-1-13，江敏儿、黄理沛拍摄；右：巨嘴柳莺，香港 2003-10-26，江敏儿、黄理沛拍摄

4. 眉纹

很多手册提到巨嘴柳莺眉纹前半段边界比较模糊，图 1 右这只便是好例子，在很多照片中，巨嘴柳莺眉纹前半段比较宽，而且没有延伸到嘴边，棕眉柳莺眉纹前半段边界比较清晰，没有比后半段更宽，而且一般会延伸到嘴边，但也有很少数例外，看图 1-2。

5. 喉部

Birds of the world 网页提到巨嘴柳莺喉部比较偏泥黄色，查看照片，发现棕眉柳莺颈和喉上半部偏白色，与喉下半部形成明显的对比，看图 1-3，这看来是个不错的特征，但大概不好单独使用。

6. 胸部细纹

很多手册都提到棕眉柳莺胸部有特有的黄色细纹，但这特征似乎很难在照片上看到，因为巨嘴柳莺胸部也有细纹，所以很难用胸部细纹来区分这两种。

7. 其他

- a. 身体颜色：巨嘴柳莺比较偏橄榄绿色，棕眉柳莺比较偏褐色；
- b. 飞羽边缘：巨嘴柳莺有比较明显的飞羽边缘，尤其是初级飞羽；
- c. 下嘴颜色：基本上这两种柳莺下嘴都是浅色为主，但很多照片可看到巨嘴柳莺下嘴尖大概有一半左右沾灰色，下嘴比棕眉柳莺深色。

参考文献

- 1. Craig Robson (2015), Birds of South-East Asia, 2nd Edition, Christopher Helm
- 2. Clement, P. (2020). Yellow-streaked Warbler (*Phylloscopus armandii*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.yeswar1.01>
- 3. Clement, P. (2020). Radde's Warbler (*Phylloscopus schwarzi*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.radwar1.01>

长尾鹡鸰和淡喉鹡鸰

张浩辉，云南鸟类学习群

淡喉鹡鸰是长尾鹡鸰十多年前的分种，云南两种都有，本文讲一下这两种鹡鸰的区分方法；

1. 长尾鹡鸰 *Spelaeoris reptatus*
2. 淡喉鹡鸰 *Spelaeoris kinneari*

这两种都是无亚种分化。

1. 分布

长尾鹡鸰在云南分布在西部至西南部，大约从怒江州、保山市、德宏州、临沧市到普洱市西南部一条狭窄地带，淡喉鹡鸰分布在东南部，大约在红河州东南部，这两种鹡鸰的分布是没有重叠的，所以单从地点就可以很好区分它们。

2. 身体比例

长尾鹡鸰尾巴比较长一些，但这个特征很难使用，一般观察角度很难准确把握这小小差异。

3. 喉部颜色及斑纹

长尾鹡鸰喉部白色，有很多小斑纹，淡喉鹡鸰喉部纯色、没有斑纹，这是这两种鹡鸰的最重要分别，看图 1-2。

4. 髭纹

淡喉鹡鸰髭纹比较明显，长尾鹡鸰一般没有髭纹，看图 1-2；但有些照片可看到长尾鹡鸰有微弱髭纹；



图 1. 上: 长尾鹟鹛, 保山市 2019-2-1, 天涯游侠拍摄; 下: 淡喉鹟鹛, 红河州屏边大围山 2020-11-7, 鸟林细语拍摄

5. 胸部

淡喉鹟鹛胸部有比较大而明显的白色鳞片状斑纹, 长尾鹟鹛胸部白色斑纹比较小, 为点状, 看图 1-2。

6. 腹部

长尾鹟鹛英文为“灰腹鹟鹛”, 雄鸟腹部中央为灰色, 淡喉鹟鹛腹部中央不是灰色, 看图 3。



图 2. 左：长尾鹛，保山市腾冲 2021-5-22，沙波拍摄；右：淡喉鹛，红河州 2018-4-6，klwei 拍摄



图 3. 左：长尾鹛，保山市腾冲 2021-5 月，钢铁侠拍摄；右：淡喉鹛，红河州 2020-10-17，云雀拍摄

7. 雌雄分别

长尾鹑鹛雌鸟橙棕色，喉部也稍沾泥黄色，看图 4；Birds of the World 网页说淡喉鹑鹛雌鸟有两个色型，主要是喉部可以白色、跟雄鸟一样，也可以泥黄色，雌鸟腹部有更多明显白色斑纹，图 2 右边这只应该是雌鸟。



图 4. 长尾鹑鹛 雌鸟，保山市 2020-12-24，鸟林细语拍摄

参考文献

1. Craig Robson (2015), Birds of South-East Asia, 2nd Edition, Christopher Helm
2. Collar, N. and C. Robson (2020). Gray-bellied Wren-Babbler (*Spelaeornis reptatus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.gybwr1.01>
3. Collar, N. and C. Robson (2020). Pale-throated Wren-Babbler (*Spelaeornis kinneari*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.patwrb1.01>

布氏鹀与理氏鹀比较

张浩辉，云南鸟类学习群

2021-5-12 钢铁侠在保山市腾冲拍到 1 只布氏鹀，是保山市首次记录，也是云南首次拍到照片（之后才知道有更早的照片），布氏鹀跟理氏鹀很相似，本文讲一下这两种鹀的区分方法；

1. 布氏鹀 *Anthus godlewskii*
2. 理氏鹀 *Anthus richardi*

这两种鹀都是无亚种分化。

1. 体型

东南亚鸟类手册 Craig Robson (2015) 记载布氏鹀体长都是 17 厘米，理氏鹀 18-20.5 厘米，Birds of the World 网页记载布氏鹀体长都是 15-17 厘米，理氏鹀 17-18 厘米，理氏鹀体型比较大，在野外如果不是两种同在一起比较，差别不明显。

2. 身体比例

- a. 理氏鹀身体比较粗壮，看图 1；
- b. 布氏鹀尾巴比较短，图 2 右这只很明显；



图 1. 左：理氏鹀，新疆 2001-夏季，张浩辉拍摄；右：布氏鹀，四川阿坝 2002-5-24，李锦昌拍摄



图 2. 左: 理氏鹡, 大理州下关洱海月公园 2020-4-28, 赵泽恒拍摄; 右: 布氏鹡, 保山市腾冲 2021-5-12, 钢铁侠拍摄

3. 头部

- a. 嘴形: 理氏鹡嘴比较长, 也比较粗壮, 看图 3, 但嘴形会受观察角度影响, 要小心使用;
- b. 眉纹: 理氏鹡眉纹在后半段比较长, 看图 4, 但在很多照片上不明显;
- c. 头冠: 布氏鹡头冠的深色纹比较清晰;

4. 中覆羽

布氏鹡中覆羽中央深色部分比较宽广, 颜色也比较扎实, 理氏鹡中覆羽中央深色部分比较尖窄, 颜色也比较模糊, 看图 4;

5. 后爪形状

理氏鹡后爪(后趾趾甲)很长, 看图 4-5 左, 布氏鹡后爪比较短, 看图 5 右;

6. 幼鸟

幼鸟大覆羽和中覆羽有明显的白色边, 形成两条白色翼斑, 看图 5, 这时中覆羽的区分特征不是很明显, 最好与其他特征协同使用。



图 3. 左：理氏鸫，北京 2006-9-10，张果老拍摄；右：布氏鸫，保山市腾冲 2021-5-12，钢铁侠拍摄



图 4. 左：理氏鸫，广东 2018-10-27，周哲拍摄；右：布氏鸫，保山市腾冲 2021-5-12，钢铁侠拍摄



图 5. 左：理氏鸚 幼鸟，香港 2010-12-27，周彬康拍摄；右：布氏鸚 幼鸟，怒江州独龙江 2016-10 月，林子大了拍摄

7. 总结

布氏鸚跟理氏鸚十分相似，身体比例、尤其是尾长、是很好的区分特征，中覆羽的特征也很有用，其他的特征最好作为辅助参考。

参考文献

1. Lars Svensson, Killian Mullarney & Dan Zetterstrom (2009), Collins Bird Guide, 2nd Edition, HarperCollins
2. Craig Robson (2015), Birds of South-East Asia, 2nd Edition, Christopher Helm
3. Tyler, S., E. de Juana, and G. M. Kirwan (2020). Blyth's Pipit (*Anthus godlewskii*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blypip1.01>
4. Tyler, S. (2020). Richard's Pipit (*Anthus richardi*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.ricpip1.01>