

云南鸟类评论

Reivew of Yunnan Birds

2024-11月

本期专辑：中国杜鹃及秧鸡亚种



封面摄影：劳俊晖

云南鸟类评论

出版说明

云南鸟类评论是非商业的电子月刊，由云南鸟类学习群出版，专门为鸟友学习云南鸟类而设，内容主要围绕云南鸟类，包括云南鸟类分类、分布等，免费提供给公众阅读。

编辑：张浩辉

本期目录（2024 年 11 月）

1. 褐翅鸦鹃	张浩辉	2
2. 绿嘴地鹃	张浩辉	4
3. 噪鹃	张浩辉	7
4. 大杜鹃	张浩辉	9
5. 白喉斑秧鸡	张浩辉	11
6. 灰胸秧鸡	张浩辉	13
7. 红胸田鸡	张浩辉	16

感谢以下鸟友为本期文章提供照片：

Roman Lo、Vincent Wang、Xiwen Chen、高僖、劳俊晖、老爷子、刘宗壮、鸟林细语、长天、周哲

封面摄影：绿嘴地鹃 *hainanus* 亚种，2023-11-4 海南尖峰岭，劳俊晖拍摄

之前发布的云南鸟类评论期刊可在这个网页下载：<https://review.ngoid.net>

云南鸟类学习群

云南鸟类学习群成立于 2019 年初。旨在推广云南鸟类学习，主要活动有微信群讨论、云南观鸟活动、云南鸟类数量调查、云南每月鸟讯、云南鸟类评论、云南州市鸟类名录更新等，目标是推动野鸟保护。

云南鸟类学习群的结构及负责人如下；

群主：张浩辉先生

义务秘书：晓芳女士

联络电话：张浩辉 18123828849

褐翅鸦鹃

张浩辉，云南鸟类学习群

褐翅鸦鹃与小鸦鹃有点相似，不难分；

1. 褐翅鸦鹃 *Centropus sinensis* (中国有 *sinensis* 与 *intermedius* 两个亚种)



图 1. 褐翅鸦鹃 *intermedius* 亚种，2017-5-8 云南盈江那邦田，Vincent Wang 拍摄

1. 区分特征

- a. 体形：大，跟普通喜鹊差不多，身体比例也相似；
- b. 颜色：黑色为主，翼全棕色；
- c. 未成年鸟：灰黑色为主，有浅色细纹及横斑，翼棕色，翼和尾有明显横斑，看图 2；
- c. 相似种：小鸦鹃繁殖羽与褐翅鸦鹃成鸟相似，但体型明显比较小，虹膜黑色、不红，背部羽轴纹十分明显。



图 2. 褐翅鸦鹃 *sinensis* 亚种未成年鸟，2017-11-6 香港，劳俊晖拍摄

2. 亚种及分布

- a. *sinensis* 亚种：在中国分布在南部近海多个省市，为留鸟；
- b. *intermedius* 亚种：在中国只分布在云南及海南，夏候鸟，这亚种跟 *sinensis* 亚种十分相似，只体型稍小。

参考文献

1. Payne, R. B. (2020). Greater Coucal (*Centropus sinensis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.grecou1.01>

绿嘴地鹃

张浩辉，云南鸟类学习群

绿嘴地鹃没有相似种，很好分；

1. 绿嘴地鹃 *Phaenicophaeus tristis* (中国有 *tristis* 与 *hainanus* 两个亚种)



图 1. 绿嘴地鹃，左： *tristis* 亚种，2011-春季，云南，老爷子拍摄；右 *hainanus* 亚种，2017-11-11 海南三亚，鸟林细语拍摄

1. 区分特征

- a. 体形：大，尾甚长、5 对尾羽长短不一；
- b. 颜色：灰绿色为主，嘴绿色，眼周边有红色裸皮，尾羽末端白色；

2. 亚种及分布

- a. *tristis* 亚种：在中国分布在西藏南部至广东，为留鸟，广东有某个外国亚种的照片，这鸟尾羽末端白色甚大片，看图 2，大概是逃逸鸟；
- b. *hainanus* 亚种：只分布在海南，为留鸟，Birds of the World 网页记载这亚种翼比较短，尾羽末端白色比较小，照片上看到尾羽末端白色跟云南的 *tristis* 亚种没明显分别，但可看到尾部比较短。

IOC 世界鸟类名录把 *hainanus* 亚种并入 *tristis* 亚种里面，Birds of the World 网页没有这样做。



图 2. 绿嘴地鹃，2022-12-24 广东，鸟林细语拍摄

参考文献

1. Payne, R. B. (2020). Green-billed Malkoha (*Phaenicophaeus tristis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.grbmal1.01>

噪鹛

张浩辉，云南鸟类学习群

噪鹛没有相似种，很好分；

1. 噪鹛 *Eudynamys scolopaceus* (中国有 *chinensis* 与 *harterti* 两个亚种)



图 1. 噪鹛 *chinensis* 亚种，左：雌鸟，2022-12-20 广东深圳，长天拍摄；右：雄鸟，2020-3-14 广东，周哲拍摄

1. 区分特征

- a. 体形：大，尾稍长；

- b. 颜色： 嘴黄绿色，成鸟虹膜鲜红色；
- c. 雄鸟： 全身黑色、沾闪蓝色；
- d. 雌鸟： 全身褐、白色斑纹相间；
- e. 幼鸟： 似雌鸟，雄幼鸟有少量黑色羽毛；

2. 亚种及分布

- a. *chinensis* 亚种：在中国分布东南半部，为夏候鸟，只云南南部及华南沿海有少量越冬；
- b. *harterti* 亚种：只分布在海南，为留鸟，Birds of the World 网页记载这亚种体形比较小，嘴比较长，但列出的数据显示这亚种翼比较长，照片上可看到嘴比较长。

参考文献

1. Limparungpatthanakij, W. L. (2024). Asian Koel (*Eudynamys scolopaceus*), version 1.1. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, T. S. Schulenberg, and M. G. Smith, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
<https://doi.org/10.2173/bow.asikoe2.01.1>

大杜鹃

张浩辉，云南鸟类学习群

大杜鹃与中杜鹃十分相似，幼鸟尤其不好分；

1. 大杜鹃 *Cuculus canorus*（中国有 *canorus*、*subtelephonus* 与 *bakeri* 三个亚种）



图 1. 大杜鹃 *subtelephonus* 亚种雄鸟，2024-6-16 内蒙古乌尔旗汉，刘宗壮拍摄

1. 区分特征

- a. 体形：大，翼长而尖、跟隼类的翼形相似；
- b. 颜色：灰色为主，成鸟虹膜浅黄至金黄色，有效区分中杜鹃成鸟；
- c. 飞羽斑点：初次飞羽白色斑点比较多，最外侧三根白点总数一般在 21 或以上，北方中杜鹃及普通中杜鹃一般在 19 或以下，只有少数例外；
- d. 雌鸟：颈侧与上胸沾棕色，另有棕色型、特别是幼鸟比较多；
- e. 幼鸟：上半身羽毛有很多小斑点。

2. 亚种及分布

- a. *canorus* 亚种：在中国北方及以外繁殖，为夏候鸟，迁徙经过中国大部分省市，这亚种下半身深色横斑不窄、跟两种中杜鹃差不多；
- b. *subtelephonus* 亚种：在中国北方边境地区及以外繁殖，为夏候鸟，迁徙经过中国大部分省市，这亚种身体灰色最淡，下半身深色横斑特别窄，看图 1；
- c. *bakeri* 亚种：在中国南半部繁殖，为夏候鸟，已知有在印渡冬，这亚种跟 *canorus* 亚种十分相似，唯上半身灰色比较深。



图 2. 大杜鹃 雄鸟，大概是 *bakeri* 亚种，2020-5-21 香港，劳俊晖拍摄

参考文献

1. Payne, R. B., D. A. Christie, and G. M. Kirwan (2020). Common Cuckoo (*Cuculus canorus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.comcuc.01>

白喉斑秧鸡

张浩辉，云南鸟类学习群

白喉斑秧鸡与红脚斑秧鸡相似，但很好分；

1. 白喉斑秧鸡 *Rallina eurizonoides* (中国有 *telmatophila* 与 *formosana* 两个亚种，另外台湾有一个记录大概是 *alvarezi* 或 *eurizonoides* 亚种)



图 1. 白喉斑秧鸡 *telmatophila* 亚种，2023-5-14 广东韶关，鸟林细语拍摄

1. 区分特征

- a. 颜色： 褐色和橙色为主，整个腹部有明显黑白相间横斑，喉部为近白色；
- b. 翼覆羽： 一般没有明显斑点，图 1 这只比较少见；
- c. 腿和脚： 灰黑色，有效排除红脚斑秧及其他相似种；
- d. 幼鸟： 成鸟的橙色换成褐色，看图 2。



图 2. 白喉斑秧鸡 *telmatophila* 亚种幼鸟，2018-10-3 广东南岭，Xiwen Chen 拍摄

2. 亚种及分布

- a. *telmatophila* 亚种：在中国分布在南部，大约自西藏南部至浙江，为留鸟，但大概有短距离季节性移动；
- b. *formosana* 亚种：只分布在台湾，为留鸟，Birds of the World 记载喉部明显白色，照片上看到跟 *telmatophila* 亚种相似，唯腹部白色横斑比较狭窄，有专家怀疑海南岛的也是这个亚种；
- c. *alvarezi* 或 *eurizonoides* 亚种：2019-2020 冬天有一只白喉斑秧鸡，腹部白色横斑明显比较狭窄，喉部完全没有白色，大概是分布在菲律宾的这两个亚种之一，为迷鸟。

参考文献

1. Taylor, B. (2020). Slaty-legged Crane (*Rallina eurizonoides*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.sllcra1.01>

灰胸秧鸡

张浩辉，云南鸟类学习群

灰胸秧鸡没有相似种，很好分；

1. 灰胸秧鸡 *Lewinia striata* (中国有 *albiventer*、*jouyi* 与 *taiwana* 三个亚种)



图 1. 灰胸秧鸡 *jouyi* 亚种，2021-12-12 福建福州花海公园，Vincent Wang 拍摄

1. 区分特征

- a. 头部： 嘴部比较长、为红色，头顶至后颈棕色、沾褐色，脸颊灰色，喉部偏白色；
- b. 上半身： 黑色和褐色为主，有很多小白点、形成横斑；
- c. 下半身： 胸部灰色，腹部褐色、有白色横斑；
- d. 雌鸟： Birds of the World 网页记载雌鸟上半身颜色比较呆滞，下半身偏白色，照片上看到雌鸟稍微偏浅褐色、灰色比较弱；
- e. 幼鸟： 头顶至后颈的棕色换成褐色，嘴部少红色，虹膜黑色，胸部泥黄色，看图 2。



图 2. 灰胸秧鸡 *jouyi* 亚种幼鸟，2019-11-8 香港，Roman Lo 拍摄

2. 亚种及分布

- a. *albiventer* 亚种：郑光美 2023 记载在中国只分布在云南、云南亦只有这亚种，为留鸟，照片上看到云南的灰胸秧鸡跟 *jouyi* 亚种没大分别，照片上也看到印度的 *albiventer* 亚种大多数头部棕色比较鲜明、少沾褐色，喉部一般全为灰色、白色不明显；
- b. *jouyi* 亚种：分布中国南部广大地区，为留鸟，Birds of the World 网页记载这亚种体型最大；
- c. *taiwana* 亚种：只分布在台湾，为留鸟，Birds of the World 网页记载这亚种身体颜色最淡，照片上看到这亚种有很多个体喉部白色十分明显。



图 3. 灰胸秧鸡 *albiventer* 亚种(?), 2018-7-11 云南德宏, 高僖拍摄

参考文献

1. Taylor, B. (2020). Slaty-breasted Rail (*Lewinia striata*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.slbrai1.01>
- 2 郑光美 (2023), 中国鸟类分类与分布名录第四版, 科学出版社

红胸田鸡

张浩辉，云南鸟类学习群

红胸田鸡与斑胁田鸡相似，不很难分；

1. 红胸田鸡 *Zapornia fusca* (郑光美 2023 记载中国有 *fusca*、*phaeopyga* 与 *erythrothorax* 三个亚种，*bakeri* 亚种已并入 *fusca* 亚种)



图 1. 红胸田鸡 *erythrothorax* 亚种，2024-6-6 北京，Vincent Wang 拍摄

1. 区分特征

- a. 体形： 身体比例跟其他相似种差不多，但体型小一点；
- b. 身体颜色： 上半身褐色，头部和下半身棕红色为主，下腹和尾下覆羽褐色有白色横斑，脚红色；
- c. 幼鸟： 身体的棕红色换成褐色，脚灰红色，冬天已长出不少成鸟的棕红色，看图 2；
- d. 相似种： 斑胁田鸡头至胸部鲜红色偏橙色，比较鲜艳，翼上覆羽一般有明显白

斑，腹部白斑很扎实、整齐。



图 2. 红胸田鸡 *erythrothorax* 亚种幼鸟，2020-11-7 香港，劳俊晖拍摄

2. 亚种及分布

- a. *fusca* 亚种：郑光美 2023 记载中国云南和四川有记录、云南只有这亚种，但 IOC 世界鸟类名录及 Birds of the World 网页都没有记载这亚种在中国有分布，有需要重新审核，分布图显示为留鸟，但云南的以夏候鸟为主，Birds of the World 网页记载这亚种下半身颜色比较暗，照片上也能看到有轻微分别，郑作新 2002 记载这亚种体型比较小；
- b. *phacopyga* 亚种：郑光美 2023 记载在台湾的是这个亚种，但 IOC 世界鸟类名录及 Birds of the World 网页都认为台湾的是 *erythrothorax* 亚种，为留鸟，照片上看到台湾的红胸田鸡眼睛周边的红色裸皮眼圈最为明显；
- c. *erythrothorax* 亚种：在中国分布在南部至东北，在北方为夏候鸟、南方为留鸟，照片上看到这亚种眼睛周边的红色裸皮眼圈最不明显。

参考文献

1. Taylor, B. and G. M. Kirwan (2020). Ruddy-breasted Crake (*Zapornia fusca*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
<https://doi.org/10.2173/bow.rubcra1.01>
- 2 郑光美 (2023), 中国鸟类分类与分布名录第四版, 科学出版社
3. 郑作新(2002), 中国鸟类系统检索第三版, 科学出版社

– 本期完 –