

云南鸟类评论

Reivew of Yunnan Birds

2025-1月

本期专辑：中国鸕鹚亚种(1)



封面摄影：周哲

云南鸟类评论

出版说明

云南鸟类评论是非商业的电子月刊，由云南鸟类学习群出版，专门为鸟友学习云南鸟类而设，内容主要围绕云南鸟类，包括云南鸟类分类、分布等，免费提供给公众阅读。

编辑：张浩辉

本期目录（2025 年 1 月）

1. 棕三趾鹑	张浩辉	2
2. 蛎鹬	张浩辉	4
3. 肉垂麦鸡	张浩辉	7
4. 金眶鸻	张浩辉	10
5. 蒙古沙鸻	张浩辉	13
6. 遗鸥	张浩辉	16

感谢以下鸟友为本期文章提供照片：

David Bakewell、Jonchan、Koel Ko、Natalie Chan、曾开心、独行虾、嘎瓦尔夏等、关朗曦、劳俊晖、老爷子、刘宗壮、勐果占碧、鸟林细语、时敏良、庭草、新疆观鸟会鸟类记录委员会、长天、周哲

封面摄影：蛎鹬 *buturlini* 亚种，2021-5-5 新疆阿勒泰，周哲拍摄

之前发布的云南鸟类评论期刊可在这个网页下载：<https://review.ngoid.net>

云南鸟类学习群

云南鸟类学习群成立于 2019 年初。旨在推广云南鸟类学习，主要活动有微信群讨论、云南观鸟活动、云南鸟类数量调查、云南每月鸟讯、云南鸟类评论、云南州市鸟类名录更新等，目标是推动野鸟保护。

云南鸟类学习群的结构及负责人如下；

群主：张浩辉先生

义务秘书：晓芳女士

联络电话：张浩辉 18123828849

棕三趾鹑

张浩辉，云南鸟类学习群

棕三趾鹑与黄脚三趾鹑有点相似，不难分；

1. 棕三趾鹑 *Turnix suscitator* (中国有 *rostratus* 与 *blakistoni* 两个亚种)



图 1. 棕三趾鹑 *blakistoni* 亚种雄鸟，2024-3-6 海南，关朗曦拍摄

1. 区分特征

- a. 体形：小，体型比日本鹌鹑小；
- b. 身体颜色：上半身棕色为主、多斑，胸部泥黄色，腹部橙色；
- c. 主要特征：胸部有很多黑色横斑，脚一般浅蓝灰色；
- d. 雌鸟：颜色比较深、偏褐色，喉至胸部有大片黑色，看图 2，雄鸟负责坐窝孵蛋，所以颜色比较平淡；
- e. 幼鸟：和雄鸟十分相似，颜色比较淡；
- f. 相似种：黄脚三趾鹑胸部橙色、腹部泥黄色，胸腹颜色是棕三趾鹑的反转，脚

黄色。



图 2. 棕三趾鹑 *blakistonii* 亚种雌鸟，2020-4-3 海南儋州，庭草拍摄

2. 亚种及分布

- a. *rostratus* 亚种：只分布在台湾，为留鸟，这亚种与 *blakistonii* 亚种相似，雌鸟在非繁殖期喉胸没有大片黑色、变得跟雄鸟十分相似，照片上看到很多个体胸部有比较多橙色；
- b. *blakistonii* 亚种：在中国分布在南部，大概有短程迁徙，这亚种非繁殖期和繁殖期相似、没有明显变化。

参考文献

1. Debus, S. and G. M. Kirwan (2020). Barred Buttonquail (*Turnix suscitator*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
<https://doi.org/10.2173/bow.barbut1.01>

蛎鹬

张浩辉，云南鸟类学习群

蛎鹬没有相似种，很好分；

1. 蛎鹬 *Haematopus ostralegus* (郑光美 2023 记录中国有 *longipes* 与 *osculans* 两个亚种, IOC 世界鸟类名录认为中国的是 *buturlini* 亚种, Birds of the World 网页认为 *buturlini* 亚种不成立、应并入 *longipes* 亚种)



图 1. 蛎鹬 *buturlini* 亚种, 2017-5-18 新疆阿勒泰, 乌林细语拍摄

1. 区分特征

- a. 体形：中，嘴长，体形跟沙锥相似；
- b. 身体颜色：黑、白两色为主，嘴和脚红色；
- c. 飞行时：翼张开时中央有明显白斑，看图 2；
- d. 幼鸟：身体稍沾褐色，嘴尖有灰黑色，虹膜颜色暗红、不鲜红，喉部下方或有半段白色颈圈。



图 2. 蛎鹬 *buturlini* 亚种，2023-4-23 新疆塘巴水库，刘宗壮拍摄

2. 亚种及分布

- a. *buturlini* 亚种：在中国主要分布在新疆，郑光美 2023 记载在西藏也有过记录，为夏候鸟，这亚种飞行时可看到外侧 5 根初级飞羽也有白色；
- b. *osculans* 亚种：在中国分布在东部沿海地区，有短程迁徙，这亚种站立时可看到翼上有比较大片白色，飞行时可看到外侧 5 根初级飞羽没有明显白色、除了羽轴，看图 3。



图 3. 蛎鹬 *osculans* 亚种幼鸟，2021-1-1 香港，劳俊晖拍摄

参考文献

1. Hockey, P., G. M. Kirwan, and P. F. D. Boesman (2020). Eurasian Oystercatcher (*Haematopus ostralegus*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.euroys1.01>
2. 郑光美 (2023), 中国鸟类分类与分布名录第四版, 科学出版社

肉垂麦鸡

张浩辉，云南鸟类学习群

肉垂麦鸡没有相似种，很好分；

1. 肉垂麦鸡 *Vanellus indicus* (中国有 *indicus* 与 *atronuchalis* 两个亚种)



图 1. 肉垂麦鸡 *atronuchalis* 亚种，2022-6-17 云南瑞丽，勐果占碧拍摄

1. 区分特征

- a. 体形：中，嘴短，形状似一只大型鸽类；
- b. 身体颜色：头部黑色为主，上半身褐色，下半身白色为主，嘴红色，脚黄色；
- c. 幼鸟：身体稍沾褐色，头部黑色还未完全长好，*atronuchalis* 亚种颈部黑色不一定完整，看图 2。



图 2. 肉垂麦鸡 *atronuchalis* 亚种幼鸟，2023-7-1 云南瑞丽，勐果占碧拍摄

2. 亚种及分布

- a. *indicus* 亚种：在新疆与巴基斯坦接壤地区有一迷鸟记录，这亚种脸颊白色连接到胸部白色、以至黑色颈圈不完整，看图 3；
- b. *atronuchalis* 亚种：在中国分布在南部，为留鸟，有迷鸟到达中国中部，这亚种成鸟有完整黑色颈圈，看图 1。



图 3. 肉垂麦鸡 *indicus* 亚种, 2016-7-13 新疆喀什塔什库尔干县明铁盖罗布盖子沟, 保护站职工嘎瓦尔夏等拍摄, 新疆观鸟会鸟类记录委员会提供

参考文献

1. Wiersma, P. and G. M. Kirwan (2020). Red-wattled Lapwing (*Vanellus indicus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
<https://doi.org/10.2173/bow.rewlap1.01>

金眶鸻

张浩辉，云南鸟类学习群

金眶鸻没有相似种，很好分；

1. 金眶鸻 *Charadrius dubius* (中国有 *curonicus* 与 *jerdoni* 两个亚种)



图 1. 金眶鸻 *curonicus* 亚种，2010-5-10 新疆，老爷子拍摄

1. 区分特征

- a. 体形：小，跟环颈鸻差不多；
- b. 身体颜色：褐色和白色为主，头部及胸部有些黑色；
- c. 主要特征：有明显金黄色眼圈，脚部颜色浅、不黑；
- d. 雌鸟：雌鸟黑色胸带比较宽，脸部稍沾褐色，眼圈直径比较小、大概是眼睛比较小；
- e. 幼鸟：身体黑色由褐色替代，眼圈不很明显，背部和翼上覆羽有狭窄泥黄色

边缘、形成鳞斑，看图 2；

- f. 非繁殖期：只有 *curonicus* 亚种有明显的非繁殖羽，跟幼鸟十分相似，上半身没有明显鳞斑。



图 2. 金眶鸻 幼鸟，2015-9-28 云南香港，劳俊晖拍摄

2. 亚种及分布

- a. *curonicus* 亚种：有在中国中部至北部繁殖，有在东部至南部渡冬，也有迁徙经过南部，因亚种区分困难，情况不是很清楚，据说只有这亚种有明显的非繁殖羽，与典型的印度 *jerdoni* 亚种比较，典型的欧洲 *curonicus* 亚种眼圈比较窄，下嘴基基本上看不到橙色，图 1 是中国北方的 *curonicus* 亚种，下嘴基一般有一小点橙色；
- b. *jerdoni* 亚种：分布有争议，大概有在中国南部繁殖，为留鸟，也许夏季有迁徙至中国中部，因亚种区分困难，情况不是很清楚，台湾的群体跟夏季华南的无大分别，但被标签为 *curonicus* 亚种，这需要更多研究，典型的

印度 *jerdoni* 亚种眼圈比较宽，下嘴基橙色比较多、上嘴基也有一点橙色，图 3 这只是典型华南的，眼圈不很宽，但嘴基橙色跟印度的相似。



图 3. 金眶鸻，大概是 *jerdoni* 亚种雌鸟，2019-4-3 广东深圳，周哲拍摄

参考文献

1. Wiersma, P., G. M. Kirwan, D. A. Christie, and P. F. D. Boesman (2024). Little Ringed Plover (*Thinornis dubius*), version 1.1. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.lirplo.01.1>

蒙古沙鸻

张浩辉，云南鸟类学习群

蒙古沙鸻跟青藏沙鸻是近年的分种，另外也与铁嘴沙鸻有点相似，不难分；

1. 蒙古沙鸻 *Anarhynchus mongolus* (中国有 *mongolus* 与 *stegmanni* 全部两个亚种)



图 1. 蒙古沙鸻 *mongolus* 亚种雄鸟，2022-4-23 广东东莞，长天拍摄

1. 区分特征

- a. 体形：中，明显比环颈鸻大，比铁嘴沙鸻稍小；
- b. 身体颜色：褐色和白色为主，头部及胸部有些黑色；
- c. 主要特征：嘴短，比青藏沙鸻稍短，比铁嘴沙鸻明显短，脚部一般为灰黑色，铁嘴沙鸻脚部颜色比较浅、一般为灰黄色；
- d. 繁殖期：胸部橙棕色，青藏沙鸻和铁嘴沙鸻都是比较纯橙色、颜色比较浅，蒙古沙鸻前额有明显白色、可排除青藏沙鸻，雄鸟上胸有一黑色线分隔

橙棕色和白色；

e. 非繁殖期：没有黑色或橙色，只能看嘴长来区分，看图 2，雌雄不大可分；

f. 幼鸟：与非繁殖羽相似，背部和翼上覆羽有狭窄泥黄色边缘、形成微弱鳞斑。



图 2. 左：青藏沙鸻 幼鸟；中：蒙古沙鸻 成鸟非繁殖羽；右：铁嘴沙鸻 幼鸟，冬天，David Bakewell 提供

2. 亚种及分布

- a. *mongolus* 亚种：在西伯利亚东部繁殖，大约在鄂霍次克海至蒙古东部，迁徙经过中国东半部，以下按照 Birds of the World 网页描述，只有繁殖羽的个体可以有效区分亚种，这亚种嘴稍微比较长，前额白色比较大片，胸部橙棕色不延伸至两胁，雄鸟上胸黑色线稍微比较窄；
- b. *stegmanni* 亚种：在西伯利亚极东部及阿拉斯加极西部繁殖，迁徙经过中国东部，在台湾比较普遍，这亚种嘴稍微比较短，前额白色比较小片，胸部橙棕色延伸至两胁、照片上这特征比较有效，雄鸟上胸黑色线稍微比较宽、但照片上不明显，看图 3。



图 3. 蒙古沙鸻, *stegmanni* 亚种, 2018-4-18 香港, Koel Ko 拍摄

参考文献

1. Mlodinow, S. G. and P. F. D. Boesman (2023). Siberian Sand-Plover (*Anarhynchus mongolus*), version 1.0. In Birds of the World (N. D. Sly, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.lessap2.01>

遗鸥

张浩辉，云南鸟类学习群

遗鸥跟棕头鸥有点相似，尤其是幼鸟，不难分；

1. 遗鸥 *Ichthyaetus relictus* (无亚种分化)
2. 棕头鸥 *Chroicocephalus brunnicephalus* (无亚种分化)



图 1. 遗鸥 繁殖羽，2018-4-14 陕西红碱淖，独行虾拍摄

1. 体形

中，大小跟棕头鸥相似，但嘴比较短。

2. 繁殖羽

- a. 头部颜色：近黑色，比棕头鸥深色，棕头鸥头部褐色；
- b. 身体颜色：稍沾粉红色；
- c. 眼部颜色：虹膜黑色，白色眼圈宽而明显，棕头鸥虹膜白色，白色眼圈不宽；
- d. 翼尖：站立时可看到有明显白点，看图 1，棕头鸥没有明显白点，飞行时可看

到遗鸥翼尖只有少量黑色，看图 3；

- e. 腿部披毛：遗鸥腿部披毛比较完整，披毛差不多到达跗骨关节，看图 1，棕头鸥腿部明显有一段没有披毛，看图 2，非繁殖羽也是这样。



图 2. 棕头鸥 繁殖羽，2017-6-19 四川阿坝，鸟林细语拍摄



图 3. 左：遗鸥 繁殖羽，2017-3-15 天津，时敏良拍摄；右：棕头鸥 繁殖羽，2017-4-7 西藏拉萨，Jonchan 拍摄

3. 非繁殖羽

- a. 头部颜色：白色，后颈有些褐色点；
- b. 眼部颜色：虹膜黑色，白色眼圈仍在，但因周边近白色而变得不很明显；
- c. 翼尖：站立时可看到有明显白点，跟繁殖羽相似；
- d. 腿部披毛：遗鸥腿部披毛比较完整，披毛差不多到达跗骨关节，跟繁殖羽相似。



图 4. 遗鸥 非繁殖羽，2021-9-20 山东日照，曾开心拍摄

4. 第一冬鸟

- a. 身体颜色：跟非繁殖羽相似，唯翼上覆羽不灰、有些褐色，磨损后变成白色，三级飞行明显褐色；
- b. 嘴部颜色：一般为近黑色，有些个体近嘴基半段呈灰黄色，棕头鸥近嘴基半段为鲜红色，而且嘴比较长；
- c. 眼部颜色：虹膜黑色，白色眼圈仍在，跟非繁殖羽相似；
- d. 翼尖：站立时翼尖没有明显白点，跟成鸟不相似，飞行时可看到近翼尖有大片黑色，翼尖有小白点，看图 6；
- e. 腿部披毛：遗鸥腿部披毛比较完整，披毛差不多到达跗骨关节，跟成鸟相似。



图 5. 遗鸥 第一冬鸟，2015-2-22 香港，Natalie Chan 拍摄



图 6. 遗鸥 第一冬鸟，2015-2-1 香港，Jonchan 拍摄

5. 分布

遗鸥有在中国北部繁殖，主要在渤海湾渡冬，中国东部沿海也有一些，可能还有未知的内陆大群渡冬点，冬天在中国内陆有迷鸟记录。

参考文献

1. Burger, J., M. Gochfeld, C. J. Sharpe, and E. Garcia (2020). Relict Gull (*Ichthyaetus relictus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.relcul2.01>

– 本期完 –